

CARGO: MÉDICO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 4
Informática Básica	5 a 7
Conhecimentos Gerais	8 a 9
Conhecimentos Específicos	10 a 30

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Como lidar com a volta ao trabalho depois da licença-maternidade

Não se cobre tanto e se organize para passar por essa fase com mais tranquilidade e gerando mais autonomia em seu filho
Por Natalia Avanci Fontenele

A volta à rotina de trabalho, após o nascimento do bebê, pode parecer um bicho de sete cabeças. O laço construído entre mãe e filho durante a gestação fica ainda mais fortalecido após a mãe tomar o bebê em seus braços e sentir seu cheiro. É mágico. Ali você se torna mãe, e a criança, filho. Por isso, o desprendimento após esse período intenso de dedicação causa ansiedade na mãe e na criança. Afinal de contas, foram 120 dias praticamente só de vocês.

Mas querer voltar ao trabalho não é apenas normal. Faz parte da vida de todas nós, e isso não torna ninguém uma mãe pior, mas, sim, fala de alguém que também precisa cuidar da carreira. Então, se planejar para esse momento, desde a gestação, é fundamental. O primeiro passo é construir uma rede de apoio de confiança que possa ajudar no momento desse “afastamento”.

Toda mãe precisa escolher as batalhas, mas nenhuma é mais importante que a felicidade de um filho. Sem desmerecer nenhuma outra, como mãe de um menino de três anos, listei cinco dicas para lidar melhor com a culpa de voltar ao trabalho e sobre como tornar esse momento mais fácil para a criança. Confira. Você vai ver que já faz muitas dessas coisas no seu dia a dia no trabalho. Por que não aplicar agora também na maternidade?

1 - Aprenda a delegar tarefas

Depois de passar meses dedicados a cuidar exclusivamente do filho, é comum sentir culpa no retorno do trabalho. A insegurança ao deixar a criança com outras pessoas é um sentimento natural. Contudo, quando isso é inevitável vai ser preciso – e desafiador – delegar a tarefa para outra pessoa. Para amenizar a insegurança, procure construir uma rede de apoio com antecedência. A criança vai ter mais tempo para interagir com essa outra pessoa, ou mesmo com outras pessoas, se você tiver mais de uma. É um momento importante para mãe e para o filho.

2 - Ouça outras experiências. Converse com mães!

Cada experiência de maternidade é única, nós sabemos, mas ouvir outras mães que estão passando ou já passaram por esse momento pode acalmar o coração. Como mãe, que tem um filho pequeno e uma rotina intensa no hospital, essa troca foi fundamental. É um momento complicado, mas vai passar. Pode confiar!

3- Aproveite melhor seu tempo e entregue qualidade

Coloque qualidade no tempo que você tem com seu filho. Esteja com ele de fato. Organize sua rotina de modo que possa aproveitar e realizar atividades importantes com ele, como brincadeiras e jogos, e acompanhar os grandes marcos da vida dele. Também é importante manter contato com a criança durante o período de trabalho com ligações curtas, por exemplo.

4- Se planeje. A amamentação pode continuar

É possível continuar amamentando, mesmo trabalhando fora. Você tem três opções para armazenar leite: de forma manual ou com uso de bombinha manual e elétrica. Não há um jeito certo, mas, sim, aquele que mais se adequa a cada mãe. Comecem a guardar o alimento 15 dias antes de retornar ao trabalho. Isso vai gerar um sentimento de mais segurança. No freezer, o leite dura 15 dias e na geladeira, 24 horas. Em casa,

você pode continuar a rotina de amamentação normalmente até que o bebê queira. Caso precise substituir o leite materno por fórmula, converse com um pediatra e tire todas as dúvidas. E segue tranquila.

5- Seja transparente. Não saia escondido

Jamais faça isso, porque quando a criança perceber, vai sentir uma sensação de abandono. Construa, desde cedo, uma relação de confiança com o bebê. Explique com carinho e “sem choramingos” que precisa se ausentar, mas que estará em casa em breve. Quando ele perceber o seu retorno, dia após dia, o choro vai diminuir. Esse momento é extremamente importante para a criança, pois ele começará a lidar melhor com a ansiedade, algo importantíssimo para seu futuro.

*Natalia Avanci Fontenele é médica pediatra e mãe do Enrico

Disponível em <https://exame.com/bussola/como-lidar-com-a-volta-ao-trabalho-depois-da-licenca-maternidade/>

1. **Análise: “o desprendimento após esse período intenso de dedicação causa ansiedade na mãe e na criança.” E assinale a alternativa que apresenta o tipo de sujeito da oração.**

- a) Oculito.
- b) Indeterminado.
- c) Composto.
- d) Simples.

2. **Análise: “o desprendimento após esse período intenso de dedicação causa ansiedade na mãe e na criança.” E assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito da oração.**

- a) Desprendimento.
- b) Período.
- c) Intenso.
- d) Dedicação.

3. **Análise e assinale a alternativa que apresenta o uso da vírgula com a mesma regra do trecho a seguir: “Toda mãe precisa escolher as batalhas, mas nenhuma é mais importante que a felicidade de um filho.”**

- a) “Jamais faça isso, porque quando a criança perceber, vai sentir uma sensação de abandono.”
- b) “Quando ele perceber o seu retorno, dia após dia, o choro vai diminuir.”
- c) “É um momento complicado, mas vai passar.”
- d) “Cada experiência de maternidade é única, nós sabemos”

4. **As dicas e a descrição delas apresentam verbos no modo imperativo, esse modo verbal tem como característica**

- a) indicar sugestões ao leitor/receptor da mensagem.
- b) indicar incertezas relacionadas à realidade presente no contexto da mensagem.
- c) indicar possibilidades perante os fatos.
- d) indicar soluções de modo exato e racional.

Informática Básica

5. Considere o seguinte cenário: um usuário deseja duplicar uma área específica de uma imagem para outra região no Paint do Windows 10, para isso, ele selecionou a ferramenta seleção retangular disponível no aplicativo. Diante do contexto, qual procedimento seria o mais apropriado para alcançar esse objetivo?

- a) Selecionar a área desejada, clicar com o botão direito e escolher "Recortar", em seguida, colar na nova região.
- b) Utilizar a opção "Clonar" após selecionar a área desejada e, em seguida, posicionar o cursor na nova região para copiar a seleção.
- c) Utilizar a ferramenta "Cortar" para extrair a área desejada, abrir um novo arquivo Paint e colar a seleção na nova imagem.
- d) Selecionar a área desejada, pressionar Ctrl+C para copiar e, em seguida, pressionar Ctrl+V para colar na nova região.

6. Navegadores e buscadores proporcionam acesso às informações disponíveis na internet. Os navegadores são responsáveis por exibir conteúdo web enquanto os buscadores facilitam a localização específica de informações. Sendo assim, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. Navegadores como o Google Chrome e o Mozilla Firefox exibem conteúdos web.

II. Bing e DuckDuckGo são exemplos de navegadores conhecidos por sua eficiência em indexar páginas e fornecer resultados de busca relevantes.

III. Buscadores não funcionam sem os cookies, pois eles armazenam as preferências do usuário e otimizam os resultados de pesquisa.

IV. Edge, Mozilla Firefox e Google são exemplos de buscadores.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e IV estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

7. Considere o seguinte cenário: um trabalhador autônomo precisa registrar os dias trabalhados em um mês, o qual cada dia trabalhado corresponde a um valor de R\$120,00. Ele mantém o seguinte modelo de registro no Microsoft Excel 365 para calcular seus ganhos mensais:

	A	B
1	Data	Valor por dia
2	01/01/2024	R\$ 120,00
3	02/01/2024	R\$ 120,00

Considerando que esse colaborador trabalhou durante o mês de janeiro inteiro e deseja calcular o total ganho no mês, qual fórmula ele deve usar para obter o resultado correto?

- a) =CONT.VALORES(B2:B32)
- b) =SOMA(B1:B3)
- c) =SOMA(B2:B32)
- d) =MÉDIA(B2:B32)

Conhecimentos Gerais

8. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guapirama-PR, sobre a Educação, cultura e desporto, assinale a alternativa correta.

- a) O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público objetivo.
- b) O não fornecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade de quem o forneceu.
- c) O ensino é livre à iniciativa privada atendida a seguinte condição de ser autorizada e avaliada a qualidade de ensino pelo poder público competente.
- d) Será respeitado o credo religioso de cada aluno.

9. Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, é um apresentador brasileiro nascido em 1950. Apresentou os programas Domingão do Faustão, exibido pela Globo, e Faustão na Band, da emissora de mesmo nome. Em 2023, aos 73 anos, Faustão foi internado com quadro de insuficiência cardíaca. O apresentador passou por um transplante em agosto do mesmo ano e, segundo o hospital Albert Einstein, a cirurgia foi um sucesso. Faustão foi submetido a um transplante de

- a) fígado.
- b) rim.
- c) coração.
- d) córneas.

Conhecimentos Específicos

10. A anemia é um dos principais problemas de saúde pública mundial, chegando a afetar mais de um quarto da população do planeta. A metade dos casos é determinada por deficiência de ferro, a deficiência nutricional mais prevalente e negligenciada no mundo. Sobre o diagnóstico e tratamento da anemia por deficiência de ferro, assinale a alternativa correta.

- a) O ferro é mais bem absorvido no duodeno e no jejuno proximal, onde as proteínas carreadoras do ferro expressam-se mais fortemente.
- b) Pacientes com anemia por deficiência de ferro têm ferro sérico baixo, transferrina baixa e uma saturação da transferrina alta.
- c) A concentração da ferritina sérica é o mais confiável marcador das reservas de ferro do corpo, porém pode haver uma ferritina falsamente diminuída na presença de doenças infecciosas ou malignas e anemia por deficiência de ferro.
- d) O ferro é mais bem absorvido como sal férrico (Fe^{3+}) e em um ambiente levemente ácido, daí a indicação de tomá-lo com suco de laranja.

11. Considerando a interpretação e conduta frente aos resultados de testes para a pesquisa de marcadores sorológicos para a hepatite B, assinale a alternativa correta.
- HBsAg reagente e Anti-HBc total não reagente: provável cura, solicitar anti-HBs.
 - HBsAg reagente e Anti-HBc total não reagente: início de fase aguda, necessário realizar teste molecular (HBV-DNA).
 - HBsAg reagente e Anti-HBc total reagente: paciente suscetível, indicar esquema vacinal.
 - HBsAg não reagente e Anti-HBc total não reagente: provável cura, solicitar anti-HBe.
12. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica de etiologia desconhecida. Ela causa destruição articular irreversível pela proliferação de macrófagos e fibroblastos na membrana sinovial após estímulo possivelmente autoimune ou infeccioso. Sobre essa doença, assinale a alternativa incorreta.
- As manifestações extra-articulares (nódulos reumatoides, vasculite, derrame pleural, episclerite) se correlacionam com pior prognóstico.
 - Nenhum exame isolado, seja laboratorial, de imagem ou histopatológico, confirma o diagnóstico.
 - Clinicamente, identificam-se poliartrite simétrica e aditiva, artralgia, rigidez matinal e exames laboratoriais de atividade inflamatória aumentados.
 - A titulação de autoanticorpos como fator reumatoide e anticorpos contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP) tem alta sensibilidade e baixa especificidade.
13. O herpes-zóster decorre da reativação do vírus da varicela, que permanece em latência no sistema nervoso após a infecção primária. Sobre essa doença, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A erupção vesicular é unilateral, raramente ultrapassa a linha mediana e segue o trajeto de um nervo sensorial ou dermatomo.
 - Lesões na ponta e asa do nariz sugerem envolvimento do ramo oftálmico do nervo facial, com possível comprometimento ocular.
 - A dor persistente, por quatro a seis semanas após a erupção cutânea, que se caracteriza pela refratariedade ao tratamento sugere nevralgia pós-herpética.
 - Casos de varicela nunca surgem após contato com pessoa infectada pelo herpes-zóster, por ser uma infecção primária.
- Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
14. Sobre a correspondência entre a hemoglobina glicada (HbA1c) e a glicemia média estimada (mg/dL), assinale a alternativa que apresenta o valor de HbA1c que deve ser encontrado em um indivíduo que apresentou uma glicemia média estimada de 240 em determinado período.
- 6%.
 - 8%.
 - 10%.
 - 12%.
15. Sobre o rastreio de rotina de comorbidades autoimunes nos indivíduos com diabetes melito tipo 1 (DM1), analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as condições em que há indicação.
- Avaliação da função tireoidiana no diagnóstico do DM1.
 - Rastreio de doença celíaca em criança com DM1, baixa estatura e diminuição da velocidade de crescimento.
 - Adultos com DM1 e hipoglicemias inexplicáveis devem investigar doença celíaca.
 - Rastreio de gastrite autoimune em indivíduos com DM1 e deficiência de vitamina D.
- Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
16. A principal medida de prevenção contra o tétano acidental é a vacinação dos suscetíveis na rotina das Unidades Básicas de Saúde em todo o País, sendo preconizada, no Calendário Básico de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações, a vacina penta. Assinale a alternativa que apresenta o esquema recomendado na vacinação contra o tétano acidental.
- A partir de 12 meses de idade, em esquema de três doses da vacina penta, com intervalo de 60 dias entre as doses, indicando-se reforço aos 4 anos de idade com a vacina DTP. A partir dessa idade, é necessário um reforço a cada cinco anos após a última dose administrada com a vacina dupla adulto (dT).
 - A partir de 5 meses de idade, em esquema de três doses da vacina penta, com intervalo de 60 dias entre as doses, indicando-se reforço aos 15 meses com a vacina DTP e um segundo reforço aos 7 anos de idade. A partir dessa idade, é necessário um reforço a cada cinco anos após a última dose administrada com a vacina dupla adulto (dT).
 - A partir de 2 meses de idade, em esquema de três doses da vacina penta, com intervalo de 60 dias entre as doses, indicando-se reforço aos 15 meses com a vacina DTP e um segundo reforço aos 4 anos de idade. A partir dessa idade, é necessário um reforço a cada três anos após a última dose administrada com a vacina dupla adulto (dT).
 - A partir de 2 meses de idade, em esquema de três doses da vacina penta, com intervalo de 60 dias entre as doses, indicando-se reforço aos 15 meses com a vacina DTP e um segundo reforço aos 4 anos de idade. A partir dessa idade, é necessário um reforço a cada dez anos após a última dose administrada com a vacina dupla adulto (dT).

17. A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução crônica que, embora curável, ainda permanece endêmica em várias regiões do mundo, principalmente na Índia, no Brasil e na Indonésia. Sobre essa doença, assinale a alternativa incorreta.

- a) A hanseníase é doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória, sendo notificados todos os casos suspeitos e confirmados de hanseníase.
- b) A principal fonte de infecção pelo bacilo são indivíduos acometidos pela hanseníase não tratados e com alta carga bacilar, que eliminam o *Mycobacterium leprae* pelas vias aéreas superiores.
- c) O *M. leprae* é um bacilo microaerófilo, ou seja, cresce em ambientes com quantidades pequenas de oxigênio. Sendo assim, ambientes fechados e com maior número de pessoas aumentam as chances de transmissão da doença.
- d) Cerca de 90% dos indivíduos infectados pelo *M. leprae* não desenvolvem a doença, fato atribuído à resistência natural contra o bacilo, que por sua vez é conferida por uma resposta imune eficaz e influenciada geneticamente.

18. O diagnóstico da malária é uma estratégia para o controle e a eliminação da doença, imprescindível para o tratamento dos pacientes de forma adequada. É recomendado que o diagnóstico da malária seja realizado em tempo oportuno (24-48 horas a partir do início dos sintomas), a fim de evitar formas graves, óbitos pela doença e contribuir para a interrupção da transmissão. Assinale a alternativa que apresenta o método amplamente adotado no Brasil para o diagnóstico da malária, simples, eficaz, de baixo custo e de fácil realização.

- a) Esfregaço delgado.
- b) Sorologia para malária.
- c) Reação em cadeia da polimerase em tempo real.
- d) Gota espessa.

19. A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), também conhecida como polirradiculoneurite aguda, é a maior causa de paralisia flácida generalizada no mundo. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.

- a) A SGB é uma doença de caráter autoimune em que aproximadamente 60% dos casos são precipitados após imunização.
- b) Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível ao paciente, ocorrendo geralmente nesta ordem: membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço.
- c) Progressão de sinais e sintomas por mais de 8 semanas sugere o diagnóstico de SGB.
- d) O prognóstico motor é pior nas crianças.

20. Assinale a alternativa que apresenta a representação eletrocardiográfica do Flutter atrial.

a)



b)



c)



d)



21. A doença cardíaca isquêmica, principal determinante da parada cardiorrespiratória (PCR), continua liderando as causas de morte no mundo. Os aspectos fundamentais do Suporte Básico de Vida no adulto incluem: reconhecimento imediato da PCR, contato com o sistema de emergência, início da ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e uso do desfibrilador externo automático, assim que disponível. Sobre os principais aspectos observados na condução da PCR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Na compressão torácica, comprima com profundidade de, no mínimo, 5cm, evitando compressões com profundidade maior que 6cm e permitindo o retorno completo do tórax após cada compressão.
 - II. Reveze com outro socorrista a cada 5 minutos, para evitar o cansaço e compressões de má qualidade.
 - III. Quando uma via aérea avançada estiver instalada, o primeiro socorrista deve administrar compressões torácicas contínuas e o segundo socorrista, aplicar uma ventilação a cada 6 segundos – cerca de 10 ventilações por minuto.
 - IV. Desfibrilação precoce é o tratamento para vítimas em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso de curta duração, que apresentaram colapso súbito em ambiente extra-hospitalar.
- a) Apenas I e III estão corretas.
 - b) Apenas II e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, III e IV estão corretas.
 - d) Apenas I, II e IV estão corretas.

22. Os betabloqueadores (BB) têm ações farmacológicas complexas, promovem a diminuição inicial do débito cardíaco e da secreção de renina, com a readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas. Sobre os efeitos adversos e contraindicações do uso dos BB, assinale a alternativa correta.

- a) Podem acarretar intolerância à glicose, induzir ao aparecimento de novos casos de diabetes melito, hipertrigliceridemia, elevação do colesterol-LDL e redução do colesterol-HDL.
- b) Os BB são contraindicados em pacientes com asma e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus, mas podem ser usados em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e diabéticos.
- c) O impacto sobre o metabolismo da glicose é minimizado quando são utilizados em combinação com diuréticos.
- d) Têm o uso recomendado em pacientes hipertensos com insônia e disfunção sexual.

23. A prova tuberculínica (PT) é utilizada para diagnóstico de infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis* e pode também auxiliar o diagnóstico de tuberculose ativa em crianças. A prova tuberculínica reativa, isoladamente, indica apenas a presença de infecção e não é suficiente para o diagnóstico da tuberculose doença. Deve ser considerada positiva quando:
- maior ou igual a 3mm.
 - maior que 3mm.
 - maior ou igual a 5mm.
 - maior que 5mm.
24. Assinale a alternativa que apresenta o exame padrão-ouro para o diagnóstico da doença celíaca.
- Endoscopia digestiva alta com biópsia de intestino delgado.
 - Dosagem do anticorpo anti gliadina.
 - Dosagem do anticorpo anti endomísio da classe IgA.
 - Colonoscopia com biópsia do intestino grosso.
25. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O rastreamento em mulheres com menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência ou mortalidade por câncer do colo do útero. Sobre a recomendação para o rastreamento através do exame citopatológico, assinale a alternativa correta.
- Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 5 anos.
 - Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo bianual e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 5 anos.
 - Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo semestral e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados anualmente.
 - Os dois primeiros exames devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos.
26. As geo-helminthíases são infecções causadas por parasitos que se desenvolvem no trato intestinal humano e completam seu ciclo evolutivo no solo e podem se disseminar na água e nos alimentos com ovos ou larvas desses agentes. Sobre essas doenças, assinale a alternativa incorreta.
- Nas ancilostomíases, ocorre penetração ativa das larvas infectantes do *Ancylostoma duodenale* ou do *Necator americanus* na pele íntegra do hospedeiro.
 - As geo-helminthíases são doenças de notificação compulsória nacional.
 - A migração errática de vermes adultos de *Ascaris lumbricoides* pode originar quadros pouco frequentes, mas muito graves de obstrução de vias aéreas, do colédoco, do canal pancreático e da luz do apêndice cecal.
 - O medicamento de primeira escolha para o tratamento é o albendazol.
27. Sobre as características da doença de Crohn, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- Nos exames radiológicos, os achados mais característicos são acometimento do intestino delgado e presença de fistulas.
 - A endoscopia mostra tipicamente lesões ulceradas, entremeadas de áreas com mucosa normal, acometimento focal, assimétrico e descontínuo.
 - A análise histológica pode indicar acometimento transmural, padrão segmentar e presença de granulomas não caseosos.
 - Tem início mais frequentemente após os 60 anos, sendo incomum antes da terceira década de vida.
- Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II, III e IV estão corretas.
28. Sobre a sífilis primária, assinale a alternativa correta.
- A primeira manifestação é caracterizada por uma úlcera rica em treponemas, geralmente única e dolorosa.
 - A lesão primária é acompanhada de linfadenopatia regional (acometendo linfonodos localizados próximos ao cancro duro).
 - Apresenta-se uma erupção macular eritematosa pouco visível (roséola), principalmente no tronco e raiz dos membros.
 - Alopecia em clareiras e madarose são achados eventuais.
29. Sobre a resolução nº 2.336/2023, do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre publicidade e propagando médicas, a captura de imagens por equipes externas de filmagem, durante a realização de procedimentos, quando a parturiente e/ou familiares assim desejarem e houver anuência do médico, fica autorizada apenas para:
- procedimentos estéticos.
 - procedimentos que não envolvam a região facial.
 - partos.
 - procedimentos que não envolvam áreas com tatuagens ou marcas de nascença.
30. Sobre as permissões ao médico quanto a publicidade médica, expostos na resolução nº 2.336/2023, do Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- É permitido ao médico utilizar fotografia ou vídeo com detalhes de seu ambiente de trabalho, sua própria imagem, de membros da equipe clínica e de outros auxiliares.
 - É permitido ao médico informar sobre valores de consultas, meios e formas de pagamento.
 - É permitido ao médico autorizar estudantes de medicina a participarem de cursos, consultorias e grupos de trabalho para discussão de casos clínicos, desde que identificados e compromissados com o respeito ao sigilo e às normas gerais do grupo, ficando o organizador responsável pela observação desses critérios.
 - É permitido ao médico revelar resultados comprováveis de tratamentos e procedimentos desde que não identifique pacientes.
- Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Todas estão corretas.